

การดูแลทุเรียน เริ่มปลูก – ก่อนให้ผลผลิต



ผลิต (ผสมปรุงแต่ง) และจัดจำหน่ายโดย : บริษัท ทีเอบี อินโนเวชัน จำกัด
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
☎ 02-954-3120-6 🌐 www.tabinnovation.co.th 📞 Line ID : @tabinnovation



การดูแลทุเรียนเริ่มปลูก-ก่อนให้ผลผลิต

ทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมาก อีกทั้งยังมีเรื่องโรค และแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทำความเสียหายได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต การปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตจึงไม่ใช่เรื่องง่าย การดูแลทุเรียนตั้งแต่เริ่มปลูกล้วนมีความสำคัญมาก ผลผลิตจะออกมาดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับดูแลตั้งแต่เริ่มต้น

การเตรียมดินก่อนปลูก

ทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อสภาพน้ำท่วมขัง สภาพดินควรเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียวปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี มีหน้าดินลึก โดยแนะนำให้ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของดินให้อยู่ในช่วง pH 5.5-6.5 ด้วย จัสเตอร์ (สารปรับปรุงสภาพดินชนิดน้ำ) ใช้ฉีดพ่นลงดินหรือปล่อยไปกับระบบน้ำ อัตรา โดยปริมาณน้ำ 80-100 ลิตร/ไร่

1. pH น้อยกว่า 4.5 ควรใช้ 15 ลิตร/ไร่

2. ช่วง pH 4.5-5.5 ควรใช้ 10 ลิตร/ไร่

3. ช่วง pH 5.5-6.5 (หรือในกรณีไม่ทราบค่า pH ของดิน)

ควรใช้ 5 ลิตร/ไร่

ไม่ควรผสม จัสเตอร์ กับสารกำจัดวัชพืช หากมีการใช้สารกำจัดวัชพืช ควรเว้นระยะเวลา 2 สัปดาห์

พีเอช < 4.5

ใช้ 15 ลิตร/ไร่

พีเอช 4.5 - 5.5

ใช้ 10 ลิตร/ไร่

พีเอช 5.6 - 6.5

ใช้ 5 ลิตร/ไร่



ระยะกล้า



การปลูกทุเรียนสามารถ แบ่งได้ 2 วิธีคือ ปลูกแบบขุดหลุมซึ่งเหมาะกับพื้นที่แล้ง และปลูกแบบยกโคนเหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุกมีน้ำขัง

ในการปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตดี ควรมีการเริ่มดูแลและป้องกันโรค ตั้งแต่ระยะกล้าด้วยการใช้ ไตร-แท็บ อัตรา 1 กิโลกรัมผสมวัสดุเพาะกล้า 100-500 กิโลกรัม และต่อมาในการรองก้นหลุมก่อนการปลูก ใช้ ไตร-แท็บ อัตรา 1 กิโลกรัม ผสมผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 100-200 กิโลกรัม ใส่หลุมละ 50-100 กรัม/ต้น

ทุเรียนในปีแรกที่ยังเล็กอยู่ต้องการ ร่มเงามาก ควรมีการพรางแสงโดยใช้แสลน บังร่ม หรือ ปลูกไม้บังร่ม เพื่อช่วยป้องกัน แสงแดดจัด และรักษาความชื้น



ระยะกล้า



ในปีแรกของการปลูก การใส่ปุ๋ยและทำโคนครั้งแรกควรห่างจากช่วงเวลาย้ายปลูกประมาณ 1 เดือน และเลือกใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงการเจริญเติบโต ปีที่ 1 ใส่ปุ๋ยและทำโคน 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1-3 ใส่ปุ๋ยคอก ครั้งที่ 4 ใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 150-200 กรัม ต่อต้น ในปีที่ 2 เป็นต้นไป ให้ทำโคนพร้อมแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้งในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝนด้วยสูตรที่มีไนโตรเจนสูง หรือสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราใช้ 1-1.5 กก./ต้น/ครั้ง พร้อมปุ๋ยคอก และผสมด้วย อีวมิก พลัส อัตรา 3 กก./ไร่ หรือ หวานอีวมิก พลัส อัตรา 20-30 กรัม (เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1-3 เมตร) ต่อต้น ทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย และอุ้มน้ำได้ดีขึ้น ส่งเสริมจุลินทรีย์ ช่วยให้รากพืชแข็งแรง อีกทั้งยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยอีกด้วย

ระยะเจริญเติบโต



ซึ่งในการเจริญเติบโต เมื่อต้นทุเรียนมีการพัฒนา ขยายทรงพุ่ม เป็นช่วงที่เกิดปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายมาก ควรป้องกันการเกิดโรคทางดินด้วยการใช้ **ไทร-แท็บ** หวานใต้ทรงพุ่ม อัตรา 1 กิโลกรัม : ปุ๋ยที่หมักแล้ว 100-200 กิโลกรัม อัตรา 50-100 กรัม/ตารางเมตร ปีละ 1-2 ครั้ง หรือปล่อยไปกับระบบน้ำ อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ปีละ 3-4 ครั้ง ใช้ **เจน-แบค** อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ลำต้นและทรงพุ่มเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคทุก 10-15 วัน กรณีเริ่มพบการระบาดของโรค ให้พ่นทุก 5-7 วัน



ช่วงแตกใบอ่อน บำรุงเพิ่มด้วย **ทีโอบี ซีวีดี** อัตรา 30 มิลลิลิตร / 20 ลิตร ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของราก ต้านทานโรคพืช และ **ทีโอบี ยูมิกซ์** อัตรา 3-5 กรัม / 20 ลิตร เพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสง และดูดซึมสารอาหารต่างๆ ไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น และป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชช่วงแตกใบอ่อน เช่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง โดยใช้บิวเวอร์ ที่อัตรา 100 กรัม / 20 ลิตร ร่วมกับเบนดิกซ์ ที่อัตรา 5-10 ซีซี / 20 ลิตร