

การใช้ผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาปลูก สตอว์เบอร์รี่



ผลิต (ผสมปรุงแต่ง) และจัดจำหน่ายโดย : บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด
! 99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
☎ 02-954-3120-6 🌐 www.tabinnovation.co.th 📞 Line ID : @tabinnovation



การเตรียมแปลงก่อนปลูก



อัตรา 10-20 กรัม
ต่อหลุม ก่อนปลูก



พีเอช < 4.5

ใช้ 15 ลิตร/ไร่

พีเอช 4.5 - 5.5

ใช้ 10 ลิตร/ไร่

พีเอช 5.6 - 6.5

ใช้ 5 ลิตร/ไร่

***หากไม่ทราบค่า pH แนะนำใช้จิสเตอร์ในอัตรา 5 ลิตร/ไร่


ผสมน้ำอัตรา 80-100 ลิตร/ไร่

การเจริญเติบโตระยะกล้า



ใช้ ไทร-แท็บ ฉีดพ่นลงดินหรือ
ปล่อยกับระบบน้ำ อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ทุก 7-10 วัน ถ้าเริ่มพบอาการโรค
ควรพ่นทุก 3-5 วัน เพื่อป้องกันโรคทางดิน

อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร



โรครากเน่าโคนเน่า

ระยะการเจริญเติบโตทางใบ ดอก และผล

ป้องกันกำจัดโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย



อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ใช้ **เจน-แบค** ฉีดให้ทั่วทรงพุ่มอัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ทุก 7-10 วัน ถ้าเริ่มพบอาการโรค ควรพ่นทุก 3-5 วัน



แมลงศัตรูที่สำคัญในสตรอว์เบอร์รี



เพลี้ยอ่อน

ใช้ **บิว-เวอร์** อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ร่วมกับสารจับใบ **เบนดิกซ์** อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร



เพลี้ยไฟ

ใช้ **เมตาไลต์** อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับ
สารจับใบ **มูฟ-เอ็กซ์** อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร



ไรสองจุด

ใช้ **เมตาไลต์** อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับ
สารจับใบ **ไซล็ค** อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร



หนอนกระทู้ผัก

ใช้ **ทีเอบี บีทีเอ** อัตรา 80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับ
สารจับใบ **เบนดิกซ์** อัตรา 3-5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร



คำแนะนำ : ควรฉีดพ่นช่วงเย็น หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด และควรใช้ตั้งแต่พบแมลงไม่เกิน 10 ตัวต่อใบ โดยฉีดพ่นให้สัมผัสกับแมลงโดยตรงทุกๆ 3-5 วัน เพื่อป้องกันการระบาด

อาหารเสริมการเจริญเติบโตระยะใบ ดอก และผล



อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

- ✓ เพิ่มความต้านทานโรคในพืช
- ✓ ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของราก
- ✓ สารสกัดจากสาหร่ายทะเล สายพันธุ์แอสโคโฟลัม โนดูซัม
- ✓ เพิ่มน้ำหนักผลและความหวาน ทำให้พืชสมบูรณ์ ตรงตามสายพันธุ์
- ✓ ช่วยเพิ่มการงอกของเมล็ดและเพิ่มการแตกตาดอกทำให้ดอกสมบูรณ์
- ✓ ช่วยเพิ่มผลผลิตและยืดอายุการเก็บเกี่ยว
- ✓ ช่วยฟื้นฟูสภาพดินหลังเก็บเกี่ยวให้ต้นสมบูรณ์



อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

- ✓ อาหารพืชในรูปอะมิโนแอซิดพืชสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ทันที
- ✓ ลดการร่วงของดอกและผลอ่อนเพิ่มจำนวนและน้ำหนักรวมของผล
- ✓ เพิ่มการแตกใบอ่อนอย่างสม่ำเสมอเพิ่มการออกดอกติดผล
- ✓ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารทั้งทางรากและทางใบ
- ✓ ป้องกันการเกิดความเครียดในพืชจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
- ✓ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสังเคราะห์แสง
- ✓ เพิ่มการสะสมอาหารเพิ่มสีเขียวกว่าแก่พืช



อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

- ✓ ช่วยป้องกันการขาดแคลเซียมและโบรอนของพืช
- ✓ ช่วยให้น้ำหนักแน่นป้องกันปัญหาแกนไส้เน่า
- ✓ ช่วยให้เกิดผลผลิตลดปัญหาผลแตก
- ✓ ช่วยให้ดอกสมบูรณ์เพิ่มปริมาณการติดผล
- ✓ ช่วยให้มีผลผลิตเหนียวลดการหลุดร่วง



อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

- มีธาตุอาหารรองและอาหารเสริม 9 ชนิด
- ✓ เพิ่มการเจริญเติบโต
- ✓ เพิ่มการออกดอก ลดปัญหาดอกหลุดร่วง
- ✓ เพิ่มน้ำหนักรวมในพืชดอก
- ✓ ป้องกันการขาดจุลธาตุ

โปรแกรมการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชในสตอว์เบอร์รี



อัตรา 100 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร




แปลงไหล



อัตรา 100 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร




เตรียมแปลงปลูก



อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร



ระยะเติบโตทางใบ - ต้น



อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร



อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร



ระยะเติบโตทางผล



อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร



อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร



อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร



อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร